



# โรคฝีดาษลิง

โรคฝีดาษลิง หรือ โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับอีสุกอีใส และใช้กรุปหุ้ม ผู้ป่วยจะมีไข้ ร่วมกับ ตุ่มผื่นตุ่มหนองทั่วตัว โรคนี้ถูกพบครั้งแรกในลิง จึงตั้งชื่อว่า ฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ รวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้ โดยมีระยะฟักตัวก่อนแสดงอาการประมาณ 5-21 วัน ส่วนใหญ่แสดงอาการในช่วง 10-14 วัน พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก

## การติดต่อ



**จากสัตว์สู่คน:** เกิดจากการสัมผัสโดยตรงจากเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนอง ถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือข่วน รับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อ




**จากคนสู่คน:** เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผ่านทางสารคัดหลั่ง ตุ่มหนอง หรือจากทางเดินหายใจ


## อาการ

มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีผื่นขึ้น ตุ่มหนอง บริเวณแขนขา และอาจเกิดบนหน้าและลำตัวได้ด้วย ส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ใน 2-4 สัปดาห์ อาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็ก ในแอฟริกาพบอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10


## การติดต่อ




หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด ตุ่มหนอง หรือสารคัดหลั่ง ของสัตว์ที่ติดเชื้อ สัตว์ป่า หรือจากผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือมีประวัติเสี่ยง



หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ



หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์



การฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้กรุปหุ้ม สร้างจาก Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) สามารถป้องกันได้ทั้งโรคใช้กรุปหุ้ม และโรคฝีดาษลิง ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ถึง 85%

ที่มา: กรมควบคุมโรค เผยโรคฝีดาษลิงติดจากสัตว์สู่คนได้ แม้มีโอกาสติดน้อยแต่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมแนะวิธีการป้องกัน (<https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/174187>)

